



**LINZ GYNOMED**



**INSTITUT FÜR MEDIKAMENTÖSEN
SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH**

ÄRZTLICHER LEITER: UNIV. DOZ. DR. MED. C. YAMAN

**BOCKGASSE 2b • 4020 LINZ • 0732 - 60 11 51
GYNOMED@A1.NET • WWW.GYNOMED.AT**

INFOBLATT FÜR PATIENTIN "MEDIKAMENTÖSER SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH"

Sehr geehrte Patientin,

Sich für einen Schwangerschaftsabbruch und gegen das Baby zu entscheiden, fällt keinem leicht. Sollten Sie sich jedoch für einen Abbruch entscheiden, gibt es die Option die Schwangerschaft medikamentös zu beenden.

Mit dem vorliegenden Folder versuchen wir praktische Informationen, die Ihnen hilfreich sein können, zu vermitteln.

Beratung: Vor der Beratung wird eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt und anschließend die Methodik (Erfolgsquote, Nebenwirkungen etc.) mit Ihnen besprochen. Ihre Fragen werden beantwortet.

Die Beratung ist unverbindlich und unentgeltlich!

Sie haben jedoch die Möglichkeit nach der Besprechung mit dem Abbruch zu beginnen.

Zeitpunkt: Ein Schwangerschaftsabbruch kann mit Medikamenten bis zur 10. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden. Entscheidend ist, ob Sie eine endgültige Entscheidung getroffen haben. Wenn ihre Entscheidung definitiv vorliegt, kann der Abbruch unmittelbar nach einem positiven Test durchgeführt werden. Das Erscheinen der Herzaktion im Ultraschall ist nicht unbedingt notwendig.

Ablauf: Die erste Medikamenteneinnahme (Mifegyne) erfolgt in unserem Institut. Es wird Ihnen ein weiteres Medikament, welches am übernächsten Tag zu Hause einzunehmen ist, mitgegeben. Dieses Medikament löst die Blutung aus. Die Abbruchsblutung ist stärker als die Menstruationsblutung und kann mit Schmerzen einhergehen. Daher bekommen Sie von uns auch Schmerzmedikamente mit.

Es wird ca. 2 Wochen nach dem Abbruch bei jeder Patientin eine Kontrolluntersuchung mit Ultraschall durchgeführt. Die Kontrolluntersuchung kann auf Wunsch bei der Fachärztin oder beim Facharzt auch stattfinden.

Termine: Termine sind bei uns nur nach Voranmeldung aber kurzfristig möglich. Bei Terminvereinbarung ist zu berücksichtigen, dass Sie am Tag der Blutung (24-72 h nach ihrem Besuch bei uns) zu Hause sein müssen. Den Termin bei uns versuchen wir also zu festzusetzen, dass der Abbruch an einem Tag, an dem Sie frei haben, z.B. Wochenende, stattfindet.

Mitzunehmen: Sofern Sie einen Blutgruppenausweis oder einen Mutter Kind Pass von einer früheren Schwangerschaft haben, nehmen Sie bitte eins von beiden mit. Wenn nicht, wird die Blutgruppe bei uns bestimmt.

Für Patientinnen unter 15 Jahren ist die Begleitung durch Erziehungsberechtigte(n) gesetzlich notwendig.

Wie sicher ist die Methode: Die Methode hat eine Sicherheit von 97%. D.h bei 3% der Patientinnen muss eine Gebärmutterausschabung (Cürettage) durchgeführt werden. Dabei handelt es sich meistens um Reste der Schwangerschaft, die operativ entfernt werden müssen. Das die Schwangerschaft sich weiterhin fortsetzt, kommt nur bei einem Prozent der behandelten Patientinnen vor.

Nebenwirkungen: Nach der Medikamenteneinnahme zu Hause kommen Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall bei ca.10% der Patientinnen vor.

Impfung: Patientinnen, deren Kinderwunsch noch nicht abgeschlossen ist und der Rhesus Faktor im Blut negativ ist, werden ab der 6. Schwangerschaftswoche geimpft. Die Impfung hat das Ziel, ev. Unverträglichkeiten in der nächsten Schwangerschaft zu vermeiden.

Kosten: Der medikamentöse Schwangerschaftsabbruch kostet 600 Euro (inkl.20% Mehrwertsteuer und ev. Rh-Impfung).

Falls eine Cürettage notwendig wird und Kosten anfallen, werden diese von uns übernommen.

Für weitere Infos stehen wir wochentags täglich von 8:00-18:00 Uhr zur Verfügung.

Gynomed Linz

Bockgasse 2b, 4020 Linz
Tel: 0732 601151 (8-18 Uhr)
gynomed@a1.net
www.gynomed.at

